

COTRIMOXAZOL

(EUSAPRIM[®])

Afleveringsvorm

Ampul met 80 mg/400 mg = 5 ml (16 mg/ml, 80 mg/ml) trimethoprim/sulfamethoxazol

Toedienen

volwassen:

Intraveneus als kortlopend infuus: toegevoegd aan 100-125 ml NaCl 0,9% of glucose 5%, in 30-90 minuten. **In geval van vochtbeperking: 1 ampulle van 80/400 mg = 5 ml co-trimoxazol toevoegen aan minimaal 75 ml NaCl 0,9% of glucose 5% (bijsluiter 2005).**

kind:

Intraveneus als kortlopend infuus van 2 tot 4 uur: toegevoegd aan NaCl 0,9% of glucose 5%.
1 ml ampulle per 15 ml glucose of fysiologisch. Bij vochtbeperking kan bij kinderen 1 ml opgelost worden in 10 ml glucose of fysiologisch maar dan is de oplossing maar exact 1 uur stabiel (Pediatric Injectable Drugs).

Code voor toedienen

Categorie B

Houdbaarheid

Na verdunnen in infuusvloeistof: 2 uur bij 20 °C
Niet bij 4 °C bewaren

Infuusvloeistoffen

NaCl 0,9%, glucose 5%, 10%, NaCl/glucose, Ringerlactaat

Verenigbaar met

Y-site: aciclovir, allopurinol, atracurium, ciclosporine, enalapriilaat, esmolol, filgastrim, labetalol, magnesiumsulfaat, morfine, pancuronium, pethidine, piperacilline, vecuronium, zidovudine

Infuus: heparine

Onverenigbaar met

Y-site: midazolam
Infuus: fluconazol, verapamil

Bijzonderheden

Co-trimoxazol mag niet tegelijk met andere infuusvloeistoffen en geneesmiddelen worden toegediend

De oplossing heeft een pH van 9,6 en bevat propyleenglycol, benzylalcohol en alcohol; cotrimoxazol mag daarom intraveneus uitsluitend verdund in een infuusoplossing worden toegediend.

Wanneer de verdunde oplossing een zichtbare troebeling of uitkristallisatie vertoont, mag deze niet worden toegediend.

Acute reacties

Pijnlijkheid op injectieplaats, exantheem, urticaria, jeuk.

Bijwerkingen

Tromboflebitis, misselijkheid, braken, diarree, glossitis, rash, duizeligheid, hoofdpijn, koorts. elden: convulsies, bloedbeeldafwijkingen, epidermale necrolyse, pseudomembraneuze colitis