



Vlaamse Vereniging van  
Ziekenhuisapothekers

CNK: 0770-669  
ATC: V03AF07

## FASTURTEC® 1,5 mg

<b>Stofnaam</b>	Rasburicase
<b>Klasse</b>	Osteo articulaire aandoeningen - jicht
<b>Farmaceutische vorm</b>	Poeder met oplosmiddel

### Bereiden

#### Oplossen met

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie 1 ml bijgeleverde oplosmiddel (zwenken, niet schudden)

#### Verder verdunnen met

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie 50 ml NaCl 0,9%

### Toedienen

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie over 30 min.

### Houdbaarheid/Bewaarcondities

<b>Product</b>	bewaren in koelkast (2-8°C) in oorspronkelijke verpakking, ter bescherming tegen licht
<b>Na oplossen</b>	onmiddellijk te gebruiken
<b>Na verdunnen</b>	24u op 2°C-8°C

Opgelet! Uit microbiologisch oogpunt dient de oplossing onmiddellijk gebruikt te worden. Oplossingen bereid in niet-aseptisch milieu zijn maximaal 24 uur houdbaar.

### Verenigbare infusen

**Onverenigbare infusen** glucose 5%



Vlaamse Vereniging van  
Ziekenhuisapothekers

CNK: 0770-669  
ATC: V03AF07

## Bijzonderheden

Altijd via aparte lijn toedienen. Lijn spoelen met NaCl 0,9%, indien de lijn nog voor ander geneesmiddel gebruikt moet worden.

pH = 8

## Bronnen

1. SKP Fasturtec (03/2016)
2. The UCL Hospitals Injectable Medicines Administration Guide (third edition, 2010)
3. Injectable Drugs Guide (2011)

(28/09/2015)

---

### DISCLAIMER

Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche.