

FENOBARBITAL

(FENOBARBITAL)

Afleveringsvorm

Ampul met 40 mg/ml en 100 mg/ml fenobarbital (als natriumzout)

Toedienen

volwassen:

- Intramusculair: onverdund
- Intraveneus als bolusinj.: onverdund, toedieningsnelheid max. 50 mg/min.
- Intraveneus als infuus: toegevoegd aan NaCl 0,9% of glucose 5% tot een concentratie van maximaal 1 mg/ml

kind:

- Intramusculair: onverdund
- Intraveneus als infuus: verdund met NaCl 0,9% of glucose 5% tot een conc. van 0,5 mg/ml, in 30 minuten (max. conc. bij vochtbeperking is 1 mg/ml)

Code voor toedienen

Categorie A en B

Houdbaarheid

Na verdunnen in infuusvloeistof: 24 uur bij 20 °C

Infuusvloeistoffen

NaCl 0,9%, glucose 5%, NaCl/glucose, Ringerlactaat

Bijzonderheden

- Fenobarbital mag niet samen worden toegediend met andere infuusvloeistoffen en geneesmiddelen.
- Fenobarbital is opgelost in een mengsel van propyleenglycol, alcohol en water. Verdunnen in een te klein volume kan resulteren in het neerslaan van fenobarbital.
- Intramusculaire toediening heeft niet de voorkeur: de injectie is pijnlijk.
- De pH van de oplossing is ongeveer 8.

Bijwerkingen

Ten gevolge van snelle intraveneuze injectie: ademhalingsdepressie, laryngospasme, hypotensie, apnoe, shock.