

PENTAZOCINE

(FORTAL[®])

Afleveringsvorm

Ampul met 30 mg = 1 ml (30 mg/ml) pentazocine (als lactaat)

Toedienen

- Subcutaan: onverdund
- Intramusculair: onverdund
- Intraveneus als bolusinjectie: onverdund, langzaam
- Intraveneus als infuus: onverdund of toegevoegd aan NaCl 0,9%

Code voor toedienen

Categorie A en B

Houdbaarheid

Onverdund en na verdunnen in infuusvloeistof: 24 uur bij 20 °C

Infuusvloeistoffen

NaCl 0,9%, glucose, NaCl/glucose

Verenigbaar met

Y-site: hydrocortison, kaliumchloride
Infuus: droperidol, fentanyl, metoclopramide, morfine, pethidine

Onverenigbaar met

Y-site: fenobarbital, natriumbicarbonaat, pentobarbital, theofylline, thiopental
Infuus: heparine

Bijzonderheden

Pentazocine valt onder de bepalingen van de Opiumwet.

Acute reacties

Pijnlijkheid op injectieplaats

Bijwerkingen

Weefselbeschadiging, tromboflebitis, na herhaalde toediening ulceratie. Sederling, ademhalingsdepressie, misselijkheid, braken, duizeligheid, transpireren, droge mond, agitatie,

hoofdpijn, angst, hallucinaties, slapeloosheid, nachtmerries, hypertensie, tachycardie. Ten gevolge van hoge intraveneuze doseringen: gegeneraliseerde tonisch-clonische convulsies