

FOSCARNET

(FOSCAVIR®)

Afleveringsvorm

Flacon met 12 g = 500 ml (24 mg/ml) foscarnetnatrium

Toedienen

- Intraveneus als kortlopend infuus: onverdund (centrale toediening) of toegevoegd aan glucose 5% of fysiologisch tot een concentratie van maximaal 12 mg/ml (perifere toediening), in tenminste 1-2 uur
- Intraveneus als langlopend infuus: onverdund (centrale toediening) of toegevoegd aan glucose 5% of fysiologisch tot een concentratie van maximaal 12 mg/ml (perifere toediening)

Code voor toedienen

Categorie B

Houdbaarheid

Na aanprikken en na verdunnen in infuusvloeistof: 24 uur bij 4 °C of 20 °C

Infuusvloeistoffen

Glucose 5%, NaCl 0,9%, NaCl/glucose

Verenigbaar met

Y-site:

amikacine, ampicilline, aztreonam, benzylpenicilline, cefalosporinen, chlooramfenicol, cimetidine, clindamycine, dexamethason, dopamine, erythromycine, fenytoïne, fluconazol, flucytosine, furosemide, gentamicine, heparine, hydrocortison, imipenem, metoclopramide, metronidazol, morfine, piperacilline, ranitidine, tobramycine, theofylline

Onverenigbaar met

Aciclovir, amfotericine B, calciumzouten, co-trimoxazol, diazepam, dobutamine, droperidol, folinezuur, ganciclovir, haloperidol, glucose 30%, haloperidol, lorazepam, midazolam, pentamidine, promethazine, Ringerlactaat, vancomycine

Bijzonderheden

Foscarnet moet onder bewaking van de nierfunctie worden toegediend. De dosering moet aan de nierfunctie worden aangepast. Nefrotoxiciteit kan worden beperkt door adequate hydratatie.

Acute reacties

Overgevoeligheidsreacties

Bijwerkingen

Tromboflebitis, reversibele nierfunctiestoornis, nefrotoxiciteit, hoofdpijn, anorexie, misselijkheid, braken, moeheid, huiduitslag, tremor, convulsies, aritmieën, hyper- en hypotensie.