

FOSFOMYCINE (FOSFOCINA[®])

Afleveringsvorm

Flacon met 4g poeder (= fosfomycine succinaat) voor oplossing voor intraveneuze injectie.

Bereiding

Los de flacon met 4g fosfomycine succinaat op in 20ml water voor injectie of glucose 5%.

Tijdens het oplossen kan de flacon warm worden omwille van een exotherme reactie.

Toediening

Toedienen als intraveneus infuus: toegevoegd aan 250ml glucose 5% of water voor injectie over 1 uur.

Houdbaarheid

De bereide oplossing in glucose 5% is 24uur stabiel.

Infuusvloeistoffen

Glucose 5%, water voor injectie

Verenigbaar met

Ringer lactaat, Bicarbonaat 1.4%, Dextrose 10%, 30% en 50%.

Onverenigbaar met

Ampicilline, erythromycine, gentamycine, tetracyclines, rifampicine.

Bijzonderheden

Er dient opgemerkt te worden dat één flacon Fosfocina[®] 4g tevens 1320 mg natrium bevat.

Bijwerkingen

Hypersensitiviteitsreacties (urticaria, anafylaxis,...), gastro-intestinale klachten.

Bron: wetenschappelijke bijsluiter

Eerste aanmaak: 28/11/2011