

NADROPARINE

(FRAXIPARINE®)

Afleveringsvorm

Wegwerpspuit met 7500 AXa IC-E = 0,3 ml, 10.000 AXa IC-E = 0,4 ml, 15.000 AXa IC-E = 0,6 ml; 20.000 AXa IC-E = 0,8 ml en 25.000 AXa IC-E = ml (25.000 AXa IC-E/ml) nadroparine

Toedienen

Subcutaan: bij voorkeur in antero- en postlaterale buikgordel, buiten de periumbilicale streek, of van het anterolaterale deel van het bovenbeen, de aanwezige luchtbel in de spuit niet verwijderen. De injectieplaats niet masseren.

Code voor toedienen

Categorie A

Houdbaarheid

Zie vermelde datum op de verpakking

Bijzonderheden

- 1 AXa IC-E komt overeen met 0,41 AXa IE (AXa = anti-Xa-activiteit, IE = internationale eenheden, IC-E = Institut Choay-Eenheden).
- 6 mg protamine-hydrochloride neutraliseert ca 2500 AXa IC-E nadroparine.

Acute reacties

Zelden: erytheem, asthma bronchiale, koorts, collaps, vaatkrampen

Bijwerkingen

Hematomen rond de injectieplaats. Zelden: huidnecrose, trombocytopenie