

FUCIDINEZUUR

(FUCIDIN[®])

Afleveringsvorm

Flacon met 500 mg natriumfusidaat poeder voor injectievloeistof

Oplosmiddel

10 ml fosfaat/citraat-bufferoplossing (bijgeleverd)

Bereiden

Los 500 mg natriumfusidaat op in 10 ml oplosmiddel. De concentratie is 50 mg/ml.

Toedienen

Volwassen:

Intraveneus als langlopend infuus: 500 mg = 10 ml toegevoegd aan 250-500 ml NaCl 0,9%, in 2-4 uur (de concentratie is maximaal 1-2 mg/ml)

kind:

Intraveneus als langlopend infuus: toegevoegd aan NaCl 0,9% of glucose 5% tot een concentratie van 1 mg/ml, in 6 uur (maximale concentratie bij vochtbeperking is 2 mg/ml)

Code voor toedienen

Categorie B

Houdbaarheid

Na verdunnen in infuusvloeistof: 24 uur bij 20 °C

Infuusvloeistoffen

NaCl 0,9%, glucose 5%, NaCl/glucose

Onverenigbaar met Ringerlactaat	Aminoglycosiden, calciumzouten, cefalosporinen,
---------------------------------	---

Bijzonderheden

- I.v.m. het ontstaan van weefselbeschadiging, mag fusidinezuur niet intramusculair of onverdund intraveneus worden toegediend.
- Bij voorkeur in een grote vene toedienen.

Acute reacties

Zelden: allergische huidreacties.

Bijwerkingen

Tromboflebitis, vaatspasmen op injectieplaats, reversibele icterus. Zelden: bloedbeeldafwijkingen, maagdarmklachten, neutropenie