

IMMUUNGLOBULINE HUMAAN

GAMMAGARD S/D®)

Afleveringsvorm

Flacon met 5 g, 10 g immunoglobuline poeder voor injectievloeistof

Oplosmiddel

Water voor injecties (bijgeleverd)

Bereiden

Los 5 g en 10 g immunoglobuline op in resp. 10 ml, 50 ml, 100 ml en 200 ml oplosmiddel. De concentratie is 50 mg/ml.

Tijdens het oplossen de flacon voorzichtig zwenken, niet schudden. Schuimvorming dient te worden voorkomen.

Toedienen

Intraveneus als infuus: onverdund, de eerste 20 ml niet sneller dan 0,5 ml/minuut, de tweede 20 ml met een snelheid van 1 ml/minuut en vervolgens 3-4 ml/minuut

Code voor toedienen

Categorie B

Houdbaarheid

Na oplossen: 12 uur bij 20 °C of 24 uur bij 4 °C

Bijzonderheden

Immunoglobuline mag niet tegelijk met andere infuusvloeistoffen en geneesmiddelen worden toegediend.

De oplostijd van de gedroogde stof is ongeveer 20-30 minuten. Er wordt een kleurloze tot lichtgele,

heldere tot licht opalescente oplossing verkregen. Beluchting van de flacon vóór het toevoegen van

water voor injecties leidt tot een langere oplostijd.

GAMMAGARD S/D® bevat humaan albumine, glycine en polyaethyleenglycol; bevat tevens 8 mmol

natrium en 2 mmol glucose per 1000 mg immunoglobuline.

Acute reacties

Allergische reacties. Zelden: anafylactische shock.

Bijwerkingen

Rugpijn, hoofdpijn, misselijkheid, braken, gewrichtspijn. Zelden: hypotensie