

TERLIPRESSIN

(GLYPRESSIN®)

Afleveringsvorm

Injectieflacon met 1 mg gevriesdroogd poeder (als acetaat, komt overeen met 0.86 mg terlipressin) en ampul met 5 ml solvens

Bereiden en toedienen (bij volwassenen)

Poeder oplossen in 5 ml van bijgevoegd solvens (0.2 mg/ml wordt bekomen)

Startdosis: 2 mg als IV bolus toedienen

Vervolg: IV injecties van 2 mg (om de 4 u). Duur: maximum 48 u

Eventueel: IV infuus (20 microgram/kg lichaamsgewicht, over 20 à 30 min, verdunnen in 100 ml NaCl 0.9%). Maximale dagdosering: 6 x 20 microgram/kg lichaamsgewicht)

Houdbaarheid

Bij voorkeur onmiddellijk na reconstitutie toedienen

Na oplossen van het poeder: 12 u houdbaar op 4°C (in koelkast, bewaren in donker)

Infuusvloeistoffen

NaCl 0,9%

Interacties

- Bloeddrukverlagende geneesmiddelen (niet-selectieve β -blokkers): bloeddrukverlagend effect kan toenemen
- Geneesmiddelen die een vertraagde hartslag veroorzaken (propofol, sufentanyl): mogelijkheid tot ernstige bradycardie

Bijzonderheden

- Enkel intraveneus toedienen om lokale necrose te vermijden
- bloeddruk - en EKG-controle steeds noodzakelijk

Bijwerkingen

- verhoogde bloeddruk
- verhoging van de darmbeweging en diarree
- bleekheid van aangezicht en lichaam
- samentrekking van de baarmoeder en verminderde doorbloeding van het endometrium (contra-indicatie: zwangerschap)

Bron

Compendium 2005