

GONADORELINE

(HRF[®], L.H.R.H.[®])

Afleveringsvorm

Flacon met 0,1 mg en 0,5 mg gonadoreline-hydrochloride (HRF[®]) poeder voor injectievloeistof

Oplosmiddel

Oplosmiddel 5 ml resp. 10 ml (bijgeleverd)

Bereiden

- Los 0,1 mg en 0,5 mg op in 5 ml oplosmiddel. De conc. is 20 microg/ml resp. 100 microg/ml.

Toedienen

- Subcutaan: onverdund
- Subcutaan met behulp van infusiepomp: onverdund
- Intraveneus als bolusinjectie: onverdund, snel toedienen
- Intraveneus als infuus (ter behandeling van overdosering van β -blokkers): toegevoegd aan gluc. 5%

Code voor toedienen

Categorie A en B

Houdbaarheid

Na oplossen en verdunnen, in pomp: 10 dagen bij 20 °C of 37 °C, mits bereid in de apotheek!

Anders: 24 uur bij 20 °C of 37 °C

Infuusvloeistoffen

Glucose 5%

Bijzonderheden

- Gonadoreline wordt met behulp van infusiepomp op pulsatiele wijze toegediend. Gebruikelijke dosering: 2-20 microg/puls, met pulsinterval van 90-120 minuten.
- Bij subcutane toediening heeft de bovenarm, de laterale thoraxwand of het gebied rond de navel de voorkeur.
- Het oplosmiddel van HRF[®] bevat 2 % benzylalcohol.
- Bij intraveneuze toediening met behulp van een spuitpomp wordt aanbevolen heparine (100-1000 E/ml) aan de oplossing toe te voegen.

Acute reacties

Pijnlijkheid op injectieplaats, urticaria, oedeem, bronchospasmen, blozen, tachycardie, anafylactische shock.

Bijwerkingen

Tromboflebitis, misselijkheid, buikpijn, hoofdpijn