

FACTOR VIII/VON WILLEBRANDFACTOR

(HAEMATE P[®])

Afleveringsvorm

Ampul met 250, 500 en 1000 IE factor VIII + 550, 1100 en 2200 IE von Willebrandfactor, ristocetine-cofactor, poeder voor injectievloeistof

Oplosmiddel

Water voor injecties (bijgeleverd)

Bereiden

Breng de flacon met poeder voor injecties en het oplosmiddel op kamertemperatuur voor oplossen.

Los 250, 500 en 1000 IE Factor VIII/von Willebrandfactor op in 10, 20 en 30 ml oplosmiddel. De concentratie per ml is resp. 25/55 IE, 25/55IE en 33,3/73,3 IE Factor VIII/Von Willebrandfactor.

Tijdens het oplossen dient de flacon niet geschud te worden, om schuimvorming te voorkomen.

Toedienen

- Intraveneus als injectie: onverdund, de toedieningssnelheid is maximaal 4 ml/minuut
- Intraveneus als infuus: onverdund, de toedieningssnelheid is maximaal 4 ml/minuut

Code voor toedienen

Categorie B

Houdbaarheid

Na oplossen: 3 uur bij 20 °C

Bijzonderheden

- Factor VIII/Von Willebrandfactor mag niet tegelijk met andere infuusvloeistoffen en geneesmiddelen worden toegediend.
- Het kan tot 10 minuten duren totdat het eiwit volledig is opgelost tot een heldere, kleurloze tot lichtgele oplossing.
- I.v.m. de eventuele aanwezigheid van enige niet geheel opgeloste vlokjes is het noodzakelijk de oplossing ofwel door een filternaald te filtreren, waarna deze direct intraveneus kan worden toegediend, ofwel toe te dienen m.b.v. een toedieningssysteem dat voorzien is van een filter.

Acute reacties

Allergische reacties. Zelden: anafylactische shock.

Bijwerkingen

Ten gevolge van hoge doseringen of frequente toediening: hemolyse. Ten gevolge van langdurig gebruik: antistoffen tegen antihemofiliefactor