

HEPATITIS A-VACCIN

(HAVRIX[®], HAVRIX JUNIOR[®])

Afleveringsvorm

Flacon met 720 E = 0,5 ml (HAVRIX JUNIOR[®]) en 1440 E = 1 ml (HA-VRIX[®]) (1440 E/ml)
hepatitis A-vaccin

Toedienen

Intramusculair: in de M. deltoideus
Voor toediening goed schudden tot een homogene, witte suspensie.

Code voor toedienen

Categorie A

Houdbaarheid

Zie vermelde datum op de verpakking

Bijzonderheden

- Bevat geïnactiveerd (dood) hepatitis-A-virus, stam HM 175, gekweekt op MRC-5 menselijke diploïde cellen.
- Hepatitis A-vaccin kan gelijktijdig met hepatitis B-vaccin of menselijk normaal immunoglobuline worden toegediend.
- Bevat 2-fenoxyethanol als conserveermiddel.
- Na primaire vaccinatie wordt gedurende tenminste 1 jaar voldoende bescherming verkregen; na revaccinatie kan dit oplopen tot 10 jaar.

Acute reacties

Pijnlijkheid en roodheid op injectieplaats, erytheem, urticaria, oedeem, hypotensie, syncope, angio-oedeem, neuritis.

Bijwerkingen

Hoofdpijn, malaise, vermoeidheid, koorts, misselijkheid, verminderde eetlust