

# Humaan hepatitis B immunoglobuline

## (IVheBex<sup>®</sup>)

### Afleveringsvorm

Poeder en solvent voor perfusie (5000 I.E/100ml) met bijhorende infuusset en filter (15 µm).

### Bereiden

- Haal de 2 flacons (poeder en solvent) uit de koelkast en breng op kamertemperatuur (gebruik ze nooit onmiddellijk na uithalen uit de koelkast).
- Voer de reconstitutie van poeder met solvent uit volgens bijgevoegde figuur (zie appendix).

Het poeder moet volledig opgelost zijn in minder dan 15 min. Het gereconstitueerde product moet visueel gecontroleerd worden op afwezigheid van partikels of verkleuring. De gereconstitueerde oplossing heeft een zekere graad van opalescentie, maar mag niet gebruikt worden bij troebeling of neerslag.

### Toedienen

Het product wordt intraveneus toegediend, onmiddellijk na reconstitutie. Sluit de vial aan op het infuusset met bijgesloten filter (15 µm). Gedurende het eerste half uur mag de toedieningssnelheid niet hoger zijn dan 1 ml/kg/uur. Indien geen intolerantie optreedt mag de snelheid nadien tot maximum 4 ml/kg/uur opgedreven worden. Men dient de patiënt na de toediening gedurende minstens 20 min op te volgen.

### Houdbaarheid

Bewaar in de koelkast (2°C-8°C), niet invriezen.

Donker bewaren (houdt de flacons in de originele verpakking).

Na reconstitutie is de oplossing stabiel gedurende 24 uur bij 25°C, doch aanbevolen wordt het product na reconstitutie onmiddellijk te gebruiken (vanuit microbiologisch standpunt)

### Onverenigbaarheden

Door afwezigheid van compatibiliteitsstudies mag IVheBex **niet** toegediend worden met andere geneesmiddelen.

### Ongewenste effecten

- koorts, rillingen
- rugpijn, spierpijn, gewrichtspijn, pijn thv de lenden
- nausea, braken
- hoofdpijn
- allergische reacties
- hypotensie, anafylactische shock

### Bijzonderheden

-Indien een allergische of anafylactische reactie optreedt dient het infuus onmiddellijk te worden gestopt.

-IVheBex doet de werkzaamheid van vaccinatie tegen mazelen, rubella, bof en varicella (levend verzwakte virussen) dalen. Daarom worden deze vaccinaties best 3 maand na IVheBex toegediend worden. Omgekeerd dient ook een periode van 3-4

weken gewacht te worden na vaccinatie vooraleer Ivhebex toe te dienen (indien niet wordt het aanbevolen om 3 maand na Ivhebex te hervaccineren).

### Appendix

