

AZATHIOPRINE

(IMURAN[®])

Afleveringsvorm

Flacon met 50 mg azathioprine (als natriumzout) poeder voor injectievloeistof

Oplosmiddel

Water voor injecties

Bereiden

Los 50 mg azathioprine (als natriumzout) op in 5 ml water voor injecties. De concentratie is 10 mg/ml.

Toedienen

Intraveneus als bolusinjectie: onverdund, in tenminste 1 minuut (gevolgd door minimaal 50 ml NaCl 0,9% of glucose 5%)

Intraveneus als kortlopend infuus: toegevoegd aan 50-100 ml NaCl 0,9% of glucose 5%, in 30-60 minuten.

Code voor toedienen

Categorie A en B

Houdbaarheid

Na verdunnen in infusievloeistof: 24 uur bij 20 °C.

Infuusvloeistoffen

NaCl 0,9%, glucose 5%, NaCl/glucose

Onverenigbaar met

Alkalische oplossingen

Bijzonderheden

Azathioprine is een niveau 2-produkt.

Bereiding van azathioprine-injectie of infuus vindt plaats in de apotheek.

De pH van de verdunde oplossing is ongeveer 9,6. Aangezien de oplossing alkalisch en prikkelend is, moet deze langzaam intraveneus gespoten worden.

Acute reacties

Exantheem, rash.

Bij huidcontact de huid grondig met zeep en veel koud water reinigen. Bij extravasatie kunnen ernstige weefselbeschadigingen ontstaan.

Bijwerkingen

Misselijkheid, braken, koorts, diarree, trombocytopenie, leukopenie.