

INDOMETACINE

(INDOCID[®])

Afleveringsvorm

Flacon met 1 mg indometacine (als natriumzout-trihydraat) poeder voor injectievloeistof

Oplosmiddel

Water voor injecties, NaCl 0,9%

Bereiden

Los 1 mg indometacine op in 1 of 2 ml oplosmiddel. De concentratie is 1 mg/ml resp. 0,5 mg/ml.

Toedienen

Intraveneus als bolusinjectie: onverdund, 0,5-1 mg/ml, in 5-10 seconden

Code voor toedienen

Categorie A

Houdbaarheid

Zie vermelde datum op de verpakking

Verenigbaar met

Y-site: furosemide, insuline, kaliumchloride, natriumbicarbonaat, nitroprusside

Onverenigbaar met

Calciumgluconaat, cimetidine, dobutamine, dopamine, gentamicine, tobramycine, tolazoline

Bijzonderheden

Verder verdunnen met infuusvloeistoffen wordt afgeraden i.v.m. de kans op neerslaan van indometacine.

Acute reacties

Pijnlijkheid en irritatie op injectieplaats.

Bijwerkingen

Braken, opgezette buik, ileus, darmperforaties, bloedingen in maagdarmkanaal, diffuse intravasale stolling, vochtretentie, (reversibele) nierfunctievermindering verergering van een infectie, verstoorde bloedchemie, pulmonale hypertensie, intracraniale bloeding