

INTERFERON-ALFA-2b

(INTRON A[®] (2b))

Afleveringsvorm

Flacon met 3 milj IE, 5 milj IE en 10 milj IE interferon-alfa 2b, poeder voor reconstitutie
Ampul met 1 ml water voor injectie

Oplosmiddel

Water voor injectie (bijgeleverd)

Bereiden

Los 3 milj IE, 5 milj IE en 10 milj IE interferon-alfa op in 1 ml oplosmiddel. De concentratie bedraagt 3 milj IE/ml, 5 milj IE/ml en 10 milj IE. Voorzichtig schudden en juiste dosis optrekken met een steriele injectiespuit uit de injectieflacon.

Toedienen

Subcutaan: onverdund

Houdbaarheid

Onmiddellijk gebruik

Bijzonderheden

- Ter vermindering van de kans op pijn en ontsteking op de injectieplaats dient de injectieplaats bij achtereenvolgende injecties te worden afgewisseld.
- voldoende vochttoediening noodzakelijk
- bewaring van flacons in frigo

Acute reacties

Pijnlijkheid en ontsteking op injectieplaats.

Bijwerkingen

Koorts, transpireren, hoofdpijn, spierpijn, gewrichtspijn, misselijkheid, duizeligheid, smaakverandering, diarree, tremoren, verwarring, slaperigheid, nierinsufficiëntie, hypertensie, bloedbeeldafwijkingen. Bij zeer hoge doses: convulsies, coma