

HUMANE ANTI-CMV IMMUNOGLOBULINEN

(IVEGAM-CMV[®])

Afleveringsvorm

Ampulle	10 ml (1 g)
Perfusieflacon	50 ml (5 g)

Bereiden en toedienen

Bestemd voor IV injectie of IV perfusie.

Indien IV perfusie gewenst is: oplossing verdunnen in NaCl 0.9%; debiet van maximum 20 druppels/min (ofwel 1ml/min).

Voor gebruik opwarmen tot kamer- of lichaamstemperatuur.

Houdbaarheid

Ongeopende flacons: bewaren bij 4°C in oorspronkelijke verpakking.
Na opening: onmiddellijk toedienen.

Infuusvloeistoffen

Ivegam-CMV mag met geen enkel product gemengd worden, behalve met NaCl 0.9%

Interacties

- vaccins op basis van levende virussen dienen vermeden te worden in de twee weken VOOR of 3 maanden NA toediening van Ivegam-CMV
- serologische testen kunnen verstoord worden kort na de toediening van Ivegam-CMV

Contra-indicaties

- overgevoeligheid voor menselijke immunoglobulinen (bv. IgG- of IgA-deficiëntie)

Bijwerkingen

Tijdens of na infusie/injectie kunnen koorts, huidreacties of veralgemeende intolerantiereacties optreden (heel zelden: shock).

Bron

Wetenschappelijke bijsluiter

(<http://www.caf-dcf.dotnet17.hostbasket.com//Lib/Cms/GetFile.aspx?id=526>)