

TRIAMCINOLONACETONIDE

(KENACORT-A[®] · LEDERSPAN[®])

Afleveringsvorm

Ampul met 10 mg = 1 ml (10 mg/ml, KENACORT-A 10[®]) en 40 mg = 1 ml (40 mg/ml, KENACORT-A 40[®]) triamcinolonacetonide
Flacon met 20 mg = 1 ml (20 mg/ml, LEDERSPAN[®]) triamcinolonhexacetonide

Toedienen

- Intramusculair: onverdund 20-40 mg/ml, diep, langzaam spuiten, bij voorkeur in de M. glutaeus
 - Intra-articulair: 10-40 mg/ml
 - Intrasynoviaal: 10-40 mg/ml
 - Intradermaal: 10 mg/ml
 - Intralaesionaal: 10 mg/ml
- Ampul of flacon voor gebruik krachtig schudden

Code voor toedienen

Categorie A

Houdbaarheid

Zie vermelde datum op de verpakking

Infuusvloeistoffen

NaCl 0,9%, glucose 5%, NaCl/glucose, water voor injecties

Bijzonderheden

- Niet geschikt voor intraveneuze toepassing; toepasbaar voor intramusculaire, -articulaire, -laesionale, -synoviale en bursale injectie.
- Oplossingen kunnen zondig voor intra- en sublaesionale toedieningen verdund worden.
- Triamcinolonacetonide kan, ter vermindering van de pijn bij injectie, ook opgelost worden in lidocaine 0,5-1%.

Acute reacties

Pijnlijkheid en irritatie op injectieplaats, urticaria, erytheem, angio-oedeem, anafylactische shock

Bijwerkingen

Natrium- en vochtretentie, hartfalen, hypertensie, spierzwakte en -atrofie, osteoporose, ulcus pepticum, vertraagde wondgenezing, convulsies, duizeligheid, hoofdpijn, menstruatiestoornissen, psychische stoornissen, gewichtstoename, verhoogde oogbaldruk, pijnloze destructie van het gewricht op injectie plaats, kristalynovitis, plaatselijke subcutane atrofie.