

# DIGOXINE

(LANOXIN<sup>®</sup>)

## Afleveringsvorm

Ampul met 0,5 mg = 2 ml (0,25 mg/ml) digoxine

## Toedienen

Intraveneus als bolusinjectie: onverdund of verdund tot maximaal 50 microg/ml in water voor injecties, glucose 5% of NaCl 0,9%, in minimaal 5 minuten

Intraveneus als infuus: toegevoegd aan 50-500 ml glucose 5% of NaCl 0,9%

## Code voor toedienen

Categorie A en B

## Houdbaarheid

Na verdunnen in infuusvloeistof: 24 uur bij 20 °C

## Infuusvloeistoffen

Glucose 5%, NaCl 0,9%, NaCl/glucose

## Verenigbaar met

Y-site: ciprofloxacin, fentanyl, kaliumchloride, morfine, pethidine

Infuus: cefradine, cimetidine, esmolol, furosemide, heparine, lidocaine, milrinon, ranitidine, theofylline, verapamil

## Onverenigbaar met

Y-site: fluconazol, foscarnet, insuline

Infuus: dobutamine, doxapram

## Bijzonderheden

Subcutane of intramusculaire toediening is pijnlijk en geeft onbetrouwbare en wisselende absorptie.

De maximale oplosbaarheid van digoxine in infuusvloeistoffen is 50 microg/ml; bij hogere concentraties kan digoxine neerslaan.

## Acute reacties

Ten gevolge van te snelle intraveneuze toediening: hypertensie, angineuze klachten, atrioventriculair block.

## **Bijwerkingen**

Aritmieën, misselijkheid, braken, duizeligheid, verwardheid