

CHLOORPROMAZINE

(LARGACTIL®)

Afleveringsvorm

Ampul met 25 mg = 5 ml (5 mg/ml) chloorpromazine (als hydrochloride)

Toedienen

volwassen:

Intramusculair: onverdund of toegevoegd aan NaCl 0,9% of glucose 5%, langzaam
Intraveneus als bolusinjectie: verdund met NaCl 0,9% of glucose 5% tot een
concentratie van 1 mg/ml, de toedieningssnelheid is maximaal 1 mg/ minuut. Een
kortlopend infuus heeft de voorkeur.

Intraveneus als kortlopend infuus: toegevoegd aan 100 ml NaCl 0,9% of glucose
5%, de
toedieningssnelheid is maximaal 1 mg/ minuut

Intraveneus als langlopend infuus: toegevoegd aan 500-1000 ml NaCl 0,9% of
glucose 5%

kind:

Intramusculair: onverdund, langzaam

Intraveneus als langlopend infuus: toegevoegd aan met NaCl 0,9% of glucose 5%
tot een

concentratie van 1 mg/ml, de toedieningssnelheid is maximaal 0,5 mg/ minuut (17)

Code voor toedienen

Categorie A en B

Houdbaarheid

Na verdunnen in infuusvloeistof: 24 uur bij 20 °C, buiten invloed van licht bewaren

Infuusvloeistoffen

NaCl 0,9%, glucose 5%, 10%, NaCl/glucose, Ringerlactaat

Verenigbaar met

Y-site: filgastrim, fluconazol, heparine, hydrocortison, kaliumchloride, ondansetron

Infuus: atropine, buprenorfine, cefazoline, doxapram, droperidol, fentanyl, metoclopramide,
midazo

lam, morfine, netilmycine, pentazocine, promethazine, scopolamine

Onverenigbaar met

Y-site: adrenaline, aztreonam, lidocaine, magnesiumsulfaat, methylprednisolon,
natriumbicarbonaat, tetracycline

Infuus: amfotericine B, ampicilline, benzylpenicilline, chlooramfenicol, cimetidine,
fenobarbital, furosemide, heparine, methohexital, pentobarbital, theofylline, thiopen-
tal

Bijzonderheden

Chloorpromazine kan, ter vermindering van de pijn bij i.m. toediening, ook worden toegevoegd aan

lidocaine 1%.

Bevat natriumpyrosulfiet. Deze stof kan overgevoeligheidsreacties veroorzaken.

Roze of geel verkleurde oplossingen niet meer gebruiken.

Acute reacties

Ten gevolge van i.m. toediening: pijn op de injectieplaats. Bronchospasmen, anafylactische shock.

Bijwerkingen

Slaperigheid, orthostatische hypotensie, droge mond, visusstoornissen, obstipatie, urinretentie, misselijkheid, braken, extrapiramidale verschijnselen, convulsies, hyperprolactinemie, bloedbeeldafwijkingen, leverfunctiestoornissen. Ten gevolge van langdurig gebruik: gynaecomastie