

# FOLINEZUUR

(LEDERVORIN<sup>®</sup>)

## Afleveringsvorm

Ampul met 3 mg = 1 ml (3 mg/ml), 50mg/5ml en 100 mg = 10 ml (10 mg/ml) folinezuur (als calciumzout)

## Toedienen

- volwassen:
- Intraveneus als bolusinjectie: onverdund of toegevoegd aan NaCl 0,9% of glucose 5%, de toedieningssnelheid is maximaal 150 mg/ minuut.
  - Intraveneus als infuus: toegevoegd aan 100-500 ml NaCl 0,9% of glucose 5%, de toedieningssnelheid is maximaal 150 mg/ minuut
- kind:
- Intraveneus als bolusinjectie: onverdund, langzaam, de toedieningssnelheid is maximaal 3 mg/kg/ minuut
  - Intraveneus als kortlopend infuus: verdund met NaCl 0,9% of glucose 5% tot een concentratie van 2 mg/ml, in 30 minuten

## Code voor toedienen

Categorie A en B

## Houdbaarheid

Na verdunnen in infuusvloeistof: 24 uur bij 20 °C

## Infuusvloeistoffen

NaCl 0,9%, glucose 5%, 10%, NaCl/glucose, Ringerlactaat

## Verenigbaar met

### Y-site:

bleomycine, cyclofosfamide, doxorubicine, filgastrim, fluconazol, fluorouracil, furosemide, heparine, metoclopramide, mitomycine, piperacilline, vinblastine, vincristine

### Infuus:

cisplatine

## Onverenigbaar met

Droperidol, foscarnet

## Bijzonderheden

- Folinezuur wordt toegepast ter vermindering van de toxiciteit van methotrexaat. In combinatie met 5-fluorouracil wordt de werking van 5-FU versterkt.
- Cave: verwisseling met foliumzuur!

## **Acute reacties**

Allergische reacties

## **Bijwerkingen**

Koorts