

OMEPRAZOL

(LOSEC®)

Afleveringsvorm

Flacon met 40 mg omeprazol (als natriumzout) poeder voor injectievloeistof
Flacon met 40 mg omeprazol (als natriumzout) poeder voor infusie

Oplosmiddel

Oplosmiddel (bijgeleverd, voor injectiepreparaat)

Bereiden

- Intraveneus als bolusinjectie: los 40 mg omeprazol op in 10 ml oplosmiddel (geen ander oplosmiddel gebruiken!). De concentratie is 4 mg/ml.
- Intraveneus als infuus: los 40 mg omeprazol op in 10 ml NaCl 0,9% of glucose 5%. De concentratie is 4 mg/ml.

Toedienen

- Intraveneus als bolusinjectie: onverdund, de toedieningssnelheid is maximaal 16 mg/min (= 4 ml/min).
- Intraveneus als infuus: toegevoegd aan 100 ml NaCl 0,9% of glucose 5%, de toedieningssnelheid is 20-30 minuten (bij toevoegen aan NaCl 0,9% in maximaal 12 uur, bij toevoegen aan glucose 5% in maximaal 6 uur)

Code voor toedienen

Categorie A en B

Houdbaarheid

Oplossing voor injectie: 4 uur bij 20 °C
Oplossing voor infusie: 12 uur bij 20 °C (in NaCl 0,9%)
6 uur bij 20 °C (in glucose 5%)

Bijzonderheden

- Omeprazol mag niet tegelijk met andere infuusvloeistoffen en geneesmiddelen worden toegediend.
- Het oplosmiddel bevat macrogol 400.

Acute reacties

Zelden: urticaria, angio-oedeem, bronchospasmen, koorts, erythema multiforme, interstitiële nefritis.

Bijwerkingen

Misselijkheid, braken, diarree, obstipatie, duizeligheid, slaperigheid, slapeloosheid, hoofdpijn.
Ten gevolge van hoge doseringen: visus- en gehoorsstoornissen, koortsaanvallen, vasculitis.