

BUPIVACAÏNE

(MARCANE[®])

Afleveringsvorm

Ampul met 50 mg = 20 ml (2,5 mg/ml, 0,25%) en 100 mg = 20 ml (5 mg/ml, 0,5%)
bupivacaine-hydrochloride en 150 mg = 20 ml (7.5mg/ml, 0.75%)
Ampul met 20 mg = 4 ml (5 mg/ml, 0,5%) bupivacaine-hydrochloride in glucose 80 mg/ml
(8%), hyperbaar

Toedienen

Lokaal: voor infiltratie- en geleidingsanaesthesie: 1,25-5 mg/ml
Epiduraal als bolusinjectie: voor epidurale anaesthesie 2,5-5 mg/ml
Epiduraal als infuus: voor epidurale anaesthesie 1,25-2,5 mg/ml, de toedieningssnelheid is
afhankelijk van de plaats van injectie, maar maximaal 400 mg/24 uur
Intrathecaal: voor intrathecale anaesthesie 5 mg/ml, al dan niet in glucose 8%

Code voor toedienen

Categorie A en B

Houdbaarheid

Zie vermelde datum op de verpakking.
Voor epiduraalcassettes: 7 dagen bij 20 °C.

Verenigbaar met

Adrenaline, fentanyl, morfine, sufentanil

Onverenigbaar met

Infuus: barbituraten, diazepam, fenytoïne, furosemide, theofylline

Acute reacties

Zelden: overgevoelighedsreacties, anafylactische shock.

Bijwerkingen

Ten gevolge van overdosering, te snelle resorptie, ongewild intravasculaire injectie:
spraakstoornissen, licht gevoel in het hoofd, duizeligheid, wazig zien, tremoren, gevolgd door
sufheid, convulsies, bewusteloosheid, apnoe. Hypotensie, depressie myocard, bradycardie,
hartstilstand