

# BUPIVACAÏNE - ADRENALINE

## MARCAINE MET ADRENALINE®)

### Afleveringsvorm

Flacon met 50 mg = 20 ml (2,5 mg/ml, 0,25%) bupivacaine-hydrochloride + adrenaline-waterstoftartraat 1: 200.000 (5 microg/ml)

Flacon met 100 mg = 20 ml (5 mg/ml, 0,5%) bupivacaine-hydrochloride + adrenaline-waterstoftartraat 1: 200.000 (5 microg/ml)

### Toedienen

Lokaal: voor infiltratie- en geleidingsanaesthesie 2,5-5 mg/ml

Epiduraal als bolusinjectie: voor epidurale anaesthesie 2,5-5 mg/ml

Epiduraal als infuus: voor epidurale anaesthesie 2,5 mg/ml

### Code voor toedienen

Categorie A en B

### Houdbaarheid

Zie vermelde datum op de verpakking.

Voor epiduraalcassettes: 7 dagen bij 20 °C.

### Verenigbaar met

Adrenaline, fentanyl, morfine, sufentanil

### Onverenigbaar met

Infuus: barbituraten, diazepam, fenytoïne, furosemide, theofylline

### Bijzonderheden

Bevat natriumpyrosulfiet

Toevoeging van adrenaline aan de injectievloeistof verlengt de duur van de anaesthesie.

### Acute reacties

Zelden: overgevoelighedsreacties, anafylactische shock.

### Bijwerkingen

Ten gevolge van overdosering, te snelle absorptie, ongewild intravasculaire injectie: spraakstoornissen, licht gevoel in het hoofd, duizeligheid, wazig zien, tremoren, gevolgd door sufheid, convulsies, bewusteloosheid, apnoe. Hypotensie, depressie myocardi, bradycardie, hartstilstand