

# METHYLERGOMETRINE

(METHERGIN<sup>®</sup>)

## Afleveringsvorm

Ampul met 0,2 mg = 1 ml (0,2 mg/ml) methylergometrinewaterstofmaleaat

## Toedienen

Subcutaan: onverdund

Intramusculair: onverdund

Intraveneus als bolusinjectie: onverdund of verdund met 5 ml NaCl 0,9%, langzaam

## Code voor toedienen

Categorie A

## Houdbaarheid

Zie vermelde datum op de verpakking.

## Infuusvloeistoffen

NaCl 0,9%

## Verenigbaar met

Y-site: heparine, hydrocortison, kaliumchloride

## Bijzonderheden

De werking treedt na intraveneuze toediening na 15-30 seconden in en na intramusculaire toediening

na 2-5 minuten.

## Acute reacties

Anafylactische reacties: hypotensie, dyspnoe, collaps, shock.

## Bijwerkingen

Buikpijn, misselijkheid, braken, transpireren, duizeligheid, hoofdpijn. Zelden: hypertensie (met name

ten gevolge van te snelle toediening en in combinatie met regionale anaesthesie en vasoconstrictoren),

bradycardie of tachycardie, pijn op de borst, perifere vasospastische reacties. Met name patiënten met

hypertensie of eclampsie kunnen ongewoon gevoelig zijn voor het hypertensief effect