

METHYLEENBLAUW

(METHYLTHIONINE)

Afleveringsvorm

Ampul met 10 mg = 1 ml (10 mg/ml) methylthionine
Ampul met 50 mg = 5 ml (0,5 mg/ml) methylthionine

Toedienen

Intraveneus als bolusinjectie: onverdund 10 mg/ml, in 5 minuten
Intraveneus als continu infuus: onverdund 0,5 mg/ml, of toegevoegd aan NaCl 0,9% (22)

Code voor toedienen

Categorie A

Houdbaarheid

Na verdunnen in infuusvloeistof: 24 uur bij 20 °C

Infuusvloeistoffen

NaCl 0,9%, glucose 5%, NaCl/glucose

Bijzonderheden

Methyleenblauw mag niet tegelijk met andere infuusvloeistoffen en geneesmiddelen worden toegediend.
Wordt ook lokaal gebruikt voor de diagnostiek van fistels.

Acute reacties

Ten gevolge van subcutane injectie: anafylactische reacties.

Bijwerkingen

Blauwkleuring urine. Ten gevolge van hoge doseringen: misselijkheid, braken, buikpijn, duizeligheid, hoofdpijn, hypertensie, transpireren, verwardheid, dyspnoe, precordiale pijn, vorming van methemoglobine, cyanose.
Ten gevolge van subcutane injectie of extravasatie: necrotische abcessen