

MIDAZOLAM B. Braun® 5 mg/5 ml

Stofnaam	Midazolam, hydrochloride
Klasse	Anesthesie – Algemene anesthesie – Sedativa in de anesthesie
Farmaceutische vorm	Oplossing voor injectie/infusie of rectale oplossing.

Bereiden

Oplossen met

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie NVT

Verder verdunnen met

- SC NVT
- IM onverdund
- IV bolus onverdund,
kinderen < 15 kg max. 1 mg/ml
- IV-perfusie NaCl 0,9% OF glucose 5%,
concentratie van 0,015 – 0,15 mg/ml
- Rectaal Indien het toe te dienen volume te klein is, water toevoegen
tot een totaal volume van 10 ml.

Toedienen

- SC NVT
- IM onverdund
- IV bolus 2 mg/min., kinderen over 2 – 3 min.
- IV perfusie continu intraveneus infuus met spuitpomp
- Rectaal d.m.v. plastic applicator aan het uiteinde van de spuit

Houdbaarheid/Bewaarcondities

Product	ter bescherming tegen licht op kamertemperatuur
Na oplossen	NVT
Na verdunnen	24 u bij kamertemperatuur (15 - 25°C) of 3 dagen bij 5°C

Opgelet! Uit microbiologisch oogpunt dient de oplossing onmiddellijk gebruikt te worden.
Oplossingen bereid in niet-aseptisch milieu zijn maximaal 24 uur houdbaar.

Verenigbare infusen	Glucose 10%, Hartmann
Onverenigbare infusen	Dextran, natriumbicarbonaat, alkalische oplossingen
Bijzonderheden	<ul style="list-style-type: none">- Een heldere kleurloze waterige oplossing- pH = 2,9 – 3,7
Bronnen	<ol style="list-style-type: none">1. SKP Midazolam B. Braun® (03/2015)2. The UCL Hospitals Injectable Medicines Administration Guide (third edition, 2010)3. Handbook on Injectable Drugs (online)

(24/11/2017)

DISCLAIMER

Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche.