

# Humane Immunoglobulinen

(Multigam<sup>®</sup>)

## Afleveringsvorm

Perfusieflacon 20 ml (1g) ; 50 ml (2.5g) ; 100 ml (5g) ; 200 ml (10g)

## Bereiden en toedienen

Bestemd voor IV perfusie

**Start van met een infusiesnelheid van 0.5 ml/minuut gedurende een kwartier om te kijken of de patiënt de immunoglobulines goed verdraagt. Te snelle infusie kan een probleem van bloeddrukval (in het extreme geval (anafylactische) shock) creëren. Begin met de verpakking met het kleinste volume (kostenbesparend).**

**Daarna kan de snelheid opgedreven worden tot een snelheid van 2.5 ml/minuut. Multigam altijd als druppelinfusus geven. (VUISTREGEL VOOR MULTIGAM 1 ML = 20 DRU)**

## Houdbaarheid

Ongeopende flacons: bewaren op kamertemperatuur in oorspronkelijke verpakking.  
Na opening: onmiddellijk toedienen.

## Infuusvloeistoffen

Multigam mag met geen enkel product gemengd worden, behalve met NaCl 0.9%

## Bijwerkingen

Tijdens of na infusie/injectie kunnen koorts, huidreacties of veralgemeende intolerantiereacties optreden (heel zelden: shock).

## Bron

Wetenschappelijke bijsluiter mei 2004