

SULPROSTON

(NALADOR)

Afleveringsvorm

Ampul met 500 microg sulproston poeder voor injectievloeistof

Oplosmiddel

NaCl 0,9%

Bereiden

Los 500 microg sulproston op in 2 ml NaCl 0,9%. De concentratie is 250 microg/ml.
Verdun door tot de gewenste concentratie met NaCl 0,9%.

Toedienen

- Intramuraal-cervicaal: 12,5 microg/ml
- Extra-amnionaal: 12,5-50 microg/ml
- Intraveneus met behulp van spuitpomp

Houdbaarheid

Onverdund en na verdunnen in infuusvloeistof: 12 uur bij 4 °C
Bij voorkeur direct voor gebruik bereiden.

Infuusvloeistoffen

NaCl 0,9%

Bijzonderheden

- Sulproston moet onder bewaking van hemodynamische parameters worden toegediend.
- Intra-arteriele toediening moet worden voorkomen i.v.m. het optreden van lokale arteriitis met necrose.
- Intramusculaire toediening wordt sterk ontraden, omdat hierbij ernstige bijwerkingen zijn opgetreden, met incidenteel een fatale cardiopulmonaire insufficiëntie.
- Bevat polyvinylpyrrolidon (povidon, PVP) en trometamol

Bijwerkingen

Misselijkheid, braken, diarree, koorts, koude rillingen, hoofdpijn, duizeligheid, sufheid, blozen, pijnlijke hypertone uteruscontracties, nabloedingen, retentio placentae, hypotensie, bradycardie, reversibele nierfunctiestoornissen, myocardischemie.

Bij epilepsie-patiënten: convulsies. Zelden: shock, weeënstorm, gynaecologische complicaties.

Bereiden

Los 2 ampullen 500 microg sulproston op in elk 2 ml NaCl 0,9% en voeg de inhoud van beide flacons toe aan 46 ml NaCl 0,9%; de eindconcentratie is 20 microg/ml, 50 ml

Houdbaarheid

Na verdunning in infuusvloeistof: 12 uur bij 20 °C, direct voor gebruik klaarmaken.

Toedienen via perfusor

Gebruikelijke dosering: 100-200 microg/uur, maximaal 500 microg/uur

SPUITENPOMP eindconcentratie is 20 microg/ml		
ml/uur	microg/min	microg/uur
5	1,7	100
7,5	2,5	150
10	3,3	200
12,5	4,2	250
15	5	300
17,5	5,8	350
20	6,7	400
22,5	7,5	450
25	8,3	500