

# NALOXON

(NARCAN<sup>®</sup>, NARCAN NEONATAAL<sup>®</sup>)

## Afleveringsvorm

Ampul met 0,4 mg = 1 ml (0,4 mg/ml) naloxonhydrochloride

Ampul met 0,04 mg = 2 ml (0,02 mg/ml) naloxonhydrochloride (NARCAN NEONATAAL<sup>®</sup>)

## Toedienen

- Subcutaan: onverdund
- Intramusculair: onverdund
- Intraveneus als bolusinjectie: onverdund of verdund in glucose 5% of NaCl 0,9%, in 15-30 seconden
- Intraveneus met behulp van spuitpomp

## Code voor toedienen

Categorie A en D

## Houdbaarheid

Na verdunnen in infuusvloeistof: 24 uur bij 20 °C, buiten invloed van licht bewaren

## Infuusvloeistoffen

Glucose 5%, NaCl 0,9%, NaCl/glucose

## Bijzonderheden

- Bij patiënten met afhankelijkheid aan opioïden kan abrupte en complete antagonering resulteren in een acuut abstinentiesyndroom.
- De pH van de oplossing is ongeveer 3,5.

## Acute reacties

Zelden: netelroos, neusverkoudheid, dyspnoe, angio-oedeem, longoedeem, anafylactische shock.

## Bijwerkingen

Ten gevolge van te snelle toediening: misselijkheid, braken, zweten, duizeligheid, hypertensie, tachycardie, tremoren, convulsies, hartstilstand.

Ten gevolge van hoge doseringen: opwinding, hypertensie, opheffing analgesie.

## Bereiden

Voeg 5 ampullen 0,4 mg = 2 ml naloxonhydrochloride toe aan 40 ml glucose 5% of NaCl 0,9%; de eindconcentratie is 40 microg/ml, 50 ml

## Houdbaarheid

Na verdunnen in infuusvloeistof: 24 uur bij 20 °C

## Toedienen via perfusor

Doseren op geleide van het effect:

Gebruikelijke doseringen:

aanvankelijk: 0,4 mg intraveneus als bolusinjectie

onderhoud: 0,2-0,4 mg/uur

SPUITENPOMP eindconcentratie is 40 microg/ml		
ml/uur	mg/uur	mg/24 uur
2,5	0,1	2,4
5,0	0,2	4,8
7,5	0,3	7,2
10,0	0,4	9,6
12,5	0,5	12,0