

# TEMOCILLINE

(NEGABAN®)

## Afleveringsvorm:

- flacon met 1 g temocilline (natrium) poeder voor injectie.
- flacon met 2 g temocilline (natrium) poeder voor injectie.

## Oplosmiddel :

- water voor injectie

## Bereiden :

- intramusculair : 1 g met 3 ml water voor inj. , NaCl 0.9%, lidocaine opl.1%
- intraveneus : 1 g in 10 ml water voor inj. of NaCl 0.9%  
2 g in 20 ml water voor inj. of NaCl 0.9%
- intraveneus als perfusie : in 40 ml water voor inj. of NaCl 0.9% of glucose 5%

## Toedienen:

- intramusculair : na bereiden onmiddellijk inspuiten
- intraveneus als injectie : onverdund over 3 à 4 minuten  
als kortlopend infuus : opgelost in 40 ml , toedienen over 30 à 40 minuten.  
**als continu infuus: 4g aangelengd met 48 ml NaCl 0.9% of glucose 5%**

(let op verschillende houdbaarheid)

## Code voor toedienen:

Categorie A enB

## Houdbaarheid:

- intramusculaire oplossingen onmiddellijk te gebruiken na bereiden.
- rechtstreekse intraveneuse oplossingen toedienen binnen het uur na bereiden.
- **de infuusoplossing is stabiel bij kamertemperatuur met NaCl 0.9% gedurende 16 uur.  
met glucose 5% gedurende 24 uur.**

## Bijzonderheden:

Een gram temocilline bevat 4,8 mEq Na<sup>+</sup>

## Onverenigbaar met :

Aminoglycosiden, Natriumbicarbonaat

Update continue toediening 12/2004