

NETILMICINE

(NETROMYCINE[®])

Afleveringsvorm

Ampul met 15 mg = 1,5 ml (10 mg/ml), ampul met 150 mg = 1,5 ml

Toedienen

volwassen:

- Intramusculair: onverdund
- Intraveneus als bolusinjectie: onverdund, langzaam
- Intraveneus als infuus: toegevoegd aan 50-100 ml NaCl 0,9% of glucose 5%, in 30-120 minuten

kind:

- Intraveneus als kortlopend infuus: verdund met NaCl 0,9% of glucose 5% tot een concentratie van 1 mg/ml, in 30 minuten (maximale concentratie bij vochtbeperking is 2 mg/ml)

Code voor toedienen

Categorie A en B

Houdbaarheid

Na verdunnen in infuusvloeistof: 24 uur bij 4 °C of 20 °C

Infuusvloeistoffen

NaCl 0,9%, glucose 5%, 10%, NaCl/glucose, Ringerlactaat

Verenigbaar met

Y-site: aztreonam, calciumgluconaat, ciprofloxacin, filgastrim, theofylline
Infuus: aminocapronzuur, atropine, cefuroxim, chloorpromazine, clindamycine, dexamethason, diazepam, doxapram, fytomenadion, hydrocortison, isoprenaline, kaliumchloride, mannitol, metronidazol, natriumbicarbonaat, natriumcalciumedetaat, neostigmine, noradrenaline, procainamide, promethazine, ranitidine

Onverenigbaar met

Y-site: furosemide, heparine
Infuus: cefalosporinen, penicillinen

Bijzonderheden

Bevat natriumpyrosulfiet. Deze stof kan overgevoeligheidsreacties veroorzaken.

Acute reacties

Huiduitslag, bronchospasmen, anafylactische shock.

Bijwerkingen

Ten gevolge van neuromusculaire blokkade: spierzwakte, dyspnoe. Hoofdpijn, malaise, visusstoornissen, desorientatie, hartkloppingen, hypotensie, paresthesie, rillingen, koorts, vochtretentie, braken, diarree.

Bij een gestoorde nierfunctie is er een verhoogde kans op nefrotoxiciteit en ototoxiciteit