

# FILGRASTIM

(NEUPOGEN®)

## Afleveringsvorm

Flacon met  $30 \times 10^6$  E = 1 ml (300microg/ml) en  $48 \times 10^6$  E = 1,6 ml (300 microg/ml) filgrastim

## Toedienen

### volwassen:

- Subcutaan: onverdund
- Intraveneus als kortlopend infuus: toegevoegd aan 100 ml glucose 5% tot een concentratie van tenminste 2 microg/ml, in 30 minuten
- Intraveneus als langlopend infuus: toegevoegd aan glucose 5% tot een concentratie van minimaal 2 microg/ml, in 24 uur

### kind:

- Subcutaan: onverdund
- Intraveneus als kortlopend infuus: verdund met glucose 5% tot een concentratie van 15 microg/ml, in 30 minuten. De min. conc. is 2 microg/ml.

## Code voor toedienen

Categorie A en B

## Houdbaarheid

Na verdunnen in glucose 5%: 24 uur bij 4 °C of 20 °C  
Flacons mogen maximaal 6 uur buiten de koelkast bewaard worden

## Infuusvloeistoffen

Glucose 5%

## Verenigbaar met

Y-site: aciclovir, allopurinol, amikacine, ampicilline, aztreonam, bleomycine, bumetanide, buprenorfine, calciumgluconaat, carboplatin, carmustine, cefazoline, ceftazidim, chloorpromazine, cimetidine, cisplatine, co-trimoxazol, cyclofosfamide, cytarabine, dacarbazine, daunorubicine, dexamethason, doxorubicine, doxycycline, droperidol, enalapriilaat, famotidine, fluconazol, fludarabine, folinezuur, ganciclovir, gentamicine, haloperidol, hydrocortison, idarubicine, ifosfamide, imipenem, kaliumchloride, lorazepam, melfalan, mercapto-ethaansulfonzuur, methotrexaat, metoclopramide, mitoxantrone, morfine, natriumbicarbonaat, netilmycine, ondansetron, pethidine, promethazine, ranitidine, theofylline, ticarcilline, tobramycine, vancomycine, vinblastine, vincristine, zidovudine

## Onverenigbaar met

Y-site: amfotericine B, cefotaxim, ceftizoxim, ceftriaxon, cefuroxim, clindamycine, dactinomycine, etoposide, fluorouracil, furosemide, heparine, mannitol, methylprednisolon, metronidazol, mitomycine, thiotepa,

### **Bijzonderheden**

- Bevat polysorbaat en mannitol.
- Subcutane toediening verdient de voorkeur.

### **Acute reacties**

Zelden: allergische reacties, irritatie rond injectieplaats

### **Bijwerkingen**

Spier- en skeletpijn, dysurie, leverfunctiestoornissen, hypotensie, ontsteking van de huidvaten, proteïnurie en hematurie. Zelden: mictiestoornissen