

# TROPISETRON

(NOVABAN®)

## Afleveringsvorm

Ampul met 5 mg = 5 ml (1 mg/ml) tropisetron (als hydrochloride)

## Toedienen

- Intraveneus als bolusinjectie: onverdund, in 3-5 minuten
- Intraveneus als kortlopend infuus: toegevoegd aan 50-100 ml NaCl 0,9% of glucose 5%, in 15 minuten.

## Code voor toedienen

Categorie A en B

## Houdbaarheid

Na verdunnen in infuusvloeistof: 24 uur bij 4 °C of 20 °C

## Infuusvloeistoffen

NaCl 0,9%, glucose 5%, NaCl/glucose

## Verenigbaar met

Y-site: amikacine, carboplatine, cisplatine, fluconazol, heparine, hydrocortison,  
kaliumchloride,  
ticarcilline, vancomycine, zidovudine  
Infuus: dexamethason, morfine

### **Onverenigbaar met**

Aciclovir, amfotericine B, fluorouracil, furosemide, ganciclovir, lorazepam, methylprednisolon, natriumbicarbonaat, piperacilline, theofylline

### **Acute reacties**

Urticaria, pruritus, exantheem.

### **Bijwerkingen**

Hoofdpijn, obstipatie, duizeligheid, moeheid, buikpijn, diarree