



Vlaamse Vereniging van
Ziekenhuisapothekers

CNK: 0062-695
ATC: J01GB01

OBRACIN® 40 mg/ml

Stofnaam	Tobramycine sulfaat
Klasse	Infecties – Antibacteriële middelen – Aminoglycosiden
Farmaceutische vorm	Oplossing voor injectie.

Bereiden

Oplossen met

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie NVT

Verder verdunnen met

- SC NVT
- IM onverdund
- IV bolus NVT
- IV perfusie 50-100 ml NaCl 0.9% OF 50-100 ml glucose 5%

Toedienen

- SC NVT
- IM directe toediening
- IV bolus NVT
- IV perfusie in 20 tot 60 min.

Houdbaarheid/Bewaarcondities

Product	15-30°C, ter bescherming van licht
Na oplossen met	NVT
Na verdunnen met	24u bij kamertemperatuur

Opgelet! Uit microbiologisch oogpunt dient de oplossing onmiddellijk gebruikt te worden.

Verenigbare infusen glucose 5% in NaCl 0,9%, glucose 5% in NaCl 0,45%, glucose 10%, Hartmann, Ringer

Onverenigbare infusen

Bijzonderheden Een looptijd van minder dan 20 min is niet aan te raden wegens een te hoge serumpiek.

pH = 3.5 – 6.5



Vlaamse Vereniging van
Ziekenhuisapothekers

CNK: 0062-695
ATC: J01GB01

Bronnen

1. SKP Obracin®, 04/2012
2. Handbook on Injectable Drugs (online, 03/05/2016)
3. Uptodate 'Tobramycin (systemic): Drug information'
4. Injectable Drugs Guide (2011)

(03/05/2016)

DISCLAIMER

Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche.