

PROTROMBINE COMPLEX

(PPSB)

Afleveringsvorm

Flacon met ongeveer 250, 500 en 1000 IE protrombine complex poeder voor injectievloeistof (aantal eenheden per flacon kan wisselen)

Oplosmiddel

Water voor injecties (bijgeleverd)

Bereiden

Breng flacon met poeder voor injectie en oplosmiddel op kamertemperatuur voor oplossen. Los 250, 500 en 1000 IE protrombine complex op in 10, 20 en 40 ml oplosmiddel. De concentratie is 25 IE/ml. Tijdens het oplossen dient de flacon niet geschud te worden om schuimvorming te voorkomen.

Toedienen

Intraveneus als infuus: onverdund, de toedieningssnelheid is maximaal 50 IE/minuut

Code voor toedienen

Categorie B

Houdbaarheid

Na oplossen: 3 uur bij 20 °C

Bijzonderheden

- Protrombine complex mag niet tegelijk met andere infuusvloeistoffen en geneesmiddelen worden toegediend.
- Bevat per ml tenminste 15 IE factor II, 5 IE factor VII, 20 IE factor IX en 15 IE factor X.
- Het kan tot 10 minuten duren, tot het eiwit volledig is opgelost tot een heldere, blauwgekleurde oplossing.

Acute reacties

Urticaria. Zelden: anafylactische shock

Bijwerkingen

Koorts, koude rillingen, hoofdpijn, misselijkheid, slaperigheid, lethargie, blozen, tintelingen, bloeddrukschommelingen (vooral bij te snelle toediening). Ten gevolge van hoge doseringen: trombo-embolische complicaties