

PANTOPRAZOLE

(PANTOMED ®)

Afleveringsvorm

Flacon met 40 mg pantoprazol (als natriumpantoprazol) poeder voor oplossing voor injectie.

Oplosmiddel

10 ml NaCl 0,9%.

Bereiden

Los 40 mg pantoprazole op in 10 ml NaCl 0,9%. De concentratie is 4 mg/ml.

Toedienen

Intraveneus als bolusinjectie: onverdund in minimum 2 minuten.
Intraveneus als kortlopend infuus: toegevoegd aan 100 ml NaCl 0,9% of glucose 5% (finale concentratie van ongeveer 0,4 mg/ml) in 15 minuten of aan een snelheid van ongeveer 7 ml/min.

Houdbaarheid

Na bereiding max 12u bij kamertemperatuur.

Infuusvloeistoffen

NaCl 0,9%, glucose 5%

Verenigbaar met

Y-site: acyclovir, allopurinol, amikacine, aminophylline, amoxicilline-clavulaanzuur, ampicilline, anidulafungine, azitromycine, bleomycine, bumetanide, carboplatine, carmustine, clindamycine, cyclofosfamide, cyclosporine, cytarabine, digoxine, docetaxel, dopamine, doripenem, doxycycline, enalapril, epinephrine, ertapenem, fluorouracil, foscarnet, furosemide, ganciclovir, gentamycine, heparine, hydrocortisone, hydromorphone, insuline, magnesiumsulfaat, mesna, methyldopa, metoclopramide, nitroglycerine, ofloxacin, oxytocine, paclitaxel, pentobarbital, phenobarbital, phenylephrine, piperacilline-tazobactam, procaïnamide, sufentanil, sulfamethoxazole-trimethoprim, teniposide, thiopental, tobramycine, tramadol, vasopressine, zidovudine.

Onverenigbaar met

Y-site: amfotericine B, atenolol, atracurium, aztreonam, buprenorfine, **calciumacetaat**, **calciumchloride**, calciumgluconaat, chloramfenicol, chloorpromazine, cimetidine, **ciprofloxacin**, cisatracurium, cisplatine, cefalosporines, dacarbazine, dactinomycine, daptomycine, daunorubicine, dexmedetomidine, diazepam, diltiazem, diphenhydramine, **dobutamine**, dolasetron, doxorubicine, ephedrine, epirubicine, esmolol, etoposide, famotidine, fentanyl, **fluconazole**, fludarabine, gemcitabine, glycopyrrolaat, haloperidol, hydralazine, hydroxyzine, idarubicine, ifosfamide, labetalol, leucovorine, **levofloxacin**, lidocaïne, **lipidenemulsies (smoflipid, TPN...)**, **linezolid**, lorazepam, methotrexaat, methylprednisolone, metoprolol, metronidazole, midazolam, milrinone, minocycline, mitomycine, mitoxantrone, naloxone, nocardipine, ondansetron, phenytoïne, **piperacilline tazobactam (www.stabilis.org)**, polymyxine B, promethazine, propranolol, quinidine, **ranitidine**, remifentanyl, thiotepa, tolazoline, topotecan, **vancomycine**, verapamil, vinblastine, vincristine, vinorelbine, voriconazole, zink.

Bijzonderheden

Bevat Na-EDTA.

Bijwerkingen

Pijn bovenaan de buik, diarree, verstopping, winderigheid, hoofdpijn. In zeer zeldzame gevallen kunnen ernstige allergische reacties of ernstige huidaandoeningen optreden.

Contra-indicaties

Gelijktijdige inname van atazanavir.
Allergie voor pantoprazole of een van de andere bestanddelen.

Bron

Wetenschappelijke bijsluiter Pantomed – laatste wijziging 04/2008.