

PAPAVERINE

(PAPAVERINE)

Afleveringsvorm

Ampul met 40 mg = 2 ml (20 mg/ml) papaverine-sulfaat

Toedienen

- Intramusculair: onverdund
- Intraveneus als bolusinjectie: onverdund, de toedieningssnelheid is maximaal 40 mg/minuut
- Intraveneus als infuus: toegevoegd aan NaCl 0,9% of glucose 5%
- Intracaverneus: 15 mg/ml, in combinatie met fentolamine

Code voor toedienen

Categorie A en B

Houdbaarheid

Niet bij 4 °C bewaren.

Na verdunnen in infuusvloeistof: 12 uur bij 20 °C

Infuusvloeistoffen

Glucose 5%, 10%, NaCl 0,9%, NaCl/glucose

Verenigbaar met

Fentolamine

Onverenigbaar met

Infuus: bromides, heparine, Ringerlactaat

Bijzonderheden

Bevat benzylalcohol.

Acute reacties

Pijnlijkheid op injectieplaats.

Bijwerkingen

Maagdarmstoornissen, duizeligheid, hoofdpijn, blozen, huiduitslag, jeuk, droge mond, leverfunctiestoornissen. Ten gevolge van hoge doseringen: hartritmestoornissen.

Na intracaverneuze toediening: priapisme, paresthesie, oppervlakkige hematoma, orgasme- en ejaculatiestoornissen, fibrose