

Paracetamol intraveneus

(Perfusalgan®)

Afleveringsvorm

Gebruiksklare flacon met 1 g paracetamol in 100 ml heldere, licht-geelachtige oplossing voor intraveneuze infusie (10 mg/ml).

Bereiden

Perfusalgan vereist geen samenstelling met een infuusmiddel.

Zoals voor elke injectie via een **glazen flacon** is het aan te bevelen een **luchtinlaat voor te bereiden**, hetzij gebruik makend van een infuus met luchtinlaat, hetzij door een extra luchtinlaat op de stop aan te sluiten.

In geval van infusie via **centrale weg**, gelieve het infuus na afloop te sluiten om elk risico op lucht in de ader te vermijden.

Toedienen

Volwassenen en adolescenten van meer dan 50 kg
De oplossing wordt toegediend als een intraveneus infuus van 15 minuten.

Kinderen van meer dan 33 kg (+/- 11 jaar), adolescenten en volwassenen van minder dan 50 kg.

In functie van het gewicht van de patiënt de benodigde hoeveelheid uit de flacon van 100 ml verwijderen en in 15 minuten infunderen.

Een interval van minstens 4 uur tussen twee toedieningen in acht nemen.
(Opmerking: een flacon Perfusalgan 1 gram is even doeltreffend als twee flacons Pro-Dafalgan 1 gram (propacetamol).)

Houdbaarheid

Het is verboden de flacons in te vriezen, in de koelkast te zetten of boven 30°C te stockeren.

Addities

Niet toegestaan. Perfusalgan mag niet met andere geneesmiddelen gemengd worden.
Bijluiter 17/09/2004

Contra-indicaties

Overgevoeligheid aan paracetamol, mannitol of een van de andere hulpstoffen.
Ernstige hepatocellulaire insufficiëntie.

Bijzondere voorzorgen

Bij overschrijden van 4 g per dag treedt zeer snel leverlijden op (hoogtepunt na 4 tot 6 dagen). Indien na twee dagen de klinische symptomen van leverlijden zich vertonen, zo snel mogelijk met een antidoot starten.
Bij ernstige nierinsufficiëntie wordt het toedieningsinterval beter 6 uur.
Opletten met het gebruik van Perfusalgan bij chronisch ethylisme, chronische malnutritie of dehydratatie.

Bijwerkingen

Zeldzame bijwerkingen zijn: malaise, hypotensie, verhoging van levertransaminasen, allergische reacties (anafylactische shock < 1/10.000), trombocytopenie.

Er dient opgemerkt te worden dat één flacon Perfusalgan 3,8 gram mannitol bevat; bij toediening van 4 flacons (maximale dosis per dag) wordt dus 15,2 gram mannitol toegediend, hetgeen mogelijks een diuretisch effect zal veroorzaken.

Datum opmaak en bron

14 augustus 2003, Wetenschappelijke brochure Perfusalgan.