

PROMETHAZINE

(PHENERGAN®)

Afleveringsvorm

Ampul met 25 mg = 1 ml en 50 mg = 2 ml (25 mg/ml) promethazine (als hydrochloride)

F.T.G

Fenothiazinen, antihistaminica

Toedienen

Intramusculaire toediening is de toedieningsweg beschreven in de bijsluiter

- Intramusculair: onverdund, diep
- Intraveneus als infuus (let op voor orthostatische hypotensie!): toegevoegd aan 50-500 ml NaCl 0,9% of glucose 5%

Code voor toedienen

Categorie A en B

Bekwaamheidsniveau

I.M./Infusie: 2
I.V.: 3

Houdbaarheid

Na verdunnen in infuusvloeistof: 24 uur bij 20 °C

Infuusvloeistoffen

NaCl 0,9%, glucose 5%, NaCl/glucose, Ringerlactaat

Verenigbaar met

Y-site: ciprofloxacin, fluconazol
Infuus: amikacine, atropine, droperidol, metoclopramide, netilmycine, pentazocine, pethidine, ranitidine

Onverenigbaar met

Y-site: furosemide, kaliumchloride, heparine, hydrocortison, methylprednisolon
Infuus: barbituraten, benzylpenicilline, chlooramfenicol, fenytoïne, morfine, natriumbicarbonaat, theofylline

Bijzonderheden

- Bevat kalium- en natriumsulfiet. Deze stoffen kunnen allergische reacties veroorzaken.
- Perivasculaire extravasatie en intra-arteriële toediening van de onverdunde oplossing kan leiden tot ernstige weefselbeschadiging.

Acute reacties

Roodheid en pijnlijkheid op injectieplaats.

Bijwerkingen

Tromboflebitis, duizeligheid, moeheid, slecht coördinatievermogen, maagdarmsstoornissen, droge mond, accommodatiestoornissen, urineretentie, spierslakte, tachycardie, bradycardie, hypotensie, veneuze trombose op injectieplaats, fotosensibiliteit