

Defibrotide®

Prociclide

Afleveringsvorm

Ampulles van 200 mg in 2.5 ml (80 mg/ml); oplossing voor injectie

Bereiden

Te verdunnen in glucose 5% of NaCl 0,9% tot een maximale concentratie van 20 mg/ml.

Toedienen

De volledige dosis wordt idealiter verdeeld over 4 toedieningen per dag. Doseerinterval = 6 uur. Doseerinterval kan in het geval van 1-2 ampulles per dag ook op 2 maal daags om de 12 uur gezet worden. Een **infusieduur van 2 uur** wordt aangeraden, tenzij bij een beperkte veneuze toegang; dan mag de infusieduur gereduceerd worden tot 30 min (minder ideaal farmacokinetisch profiel). Intramusculair gebruik kan.

Houdbaarheid

- Stabiliteit : 72u in glucose 5% of NaCl 0.9% bij KT.

Onverenigbaarheden

Niet toedienen via hetzelfde lumen van eender welk ander geneesmiddel. Geen gegevens over compatibiliteit met andere geneesmiddelen.

Acute reacties

Flushes, hoofdpijn, hypotensie van voorbijgaande aard.

Bijzonderheden

Andere coagulantia 12 uur voor start defibrotide stoppen (in overleg met de geneesheer).

Twee uur voor een chirurgische ingreep moet de volledige dosis van defibrotide toegediend zijn.

Bron

Defibrotide administration guidelines ; prociclide (SPC) 1996; Defibrotide (NORAVID®; document apotheek T Bauters 7/7/2008)
Aanmaak 24/11/2009