

INTERLEUKIN-2

(PROLEUKIN®)

Afleveringsvorm

Flacon met 1 mg = $18 \cdot 10^6$ IE interleukine-2 (IL-2) poeder voor injectievloeistof

Oplosmiddel

Water voor injecties

Bereiden

Los 1 mg interleukine-2 op in 1,2 ml water voor injecties. De concentratie is 1 mg/ml.

Voorkom
schuimvorming door het oplosmiddel tegen de wand van de flacon te spuiten en op te lossen
door
voorzichtig te zwenken. De oplossing is helder en kleurloos.

Toedienen

Subcutaan: onverdund

Intraveneus als infuus: toegevoegd aan 50-1000 ml glucose 5%, in 24 uur

Code voor toedienen

Categorie A en B

Houdbaarheid

Onverdund en na verdunnen in infuusvloeistof: 24 uur bij 4 °C of 20 °C

Infuusvloeistoffen

Glucose 5%

Bijzonderheden

Interleukine mag niet tegelijk met andere infuusvloeistoffen en geneesmiddelen worden
toegediend.

$18 \cdot 10^6$ Internationale Eenheden = $3 \cdot 10^6$ Cetus eenheden = 1 mg interleukine

Bevat mannitol en natriumdodecylsulfaat.

Parenterale toediening van interleukine-2 kan ernstige bijwerkingen veroorzaken, waaronder hypotensie, dyspnoe en vochtretentie.

Acute reacties

Erytheem, uitslag.

Bijwerkingen

Hypotensie, aritmieën, tachycardie, angina pectoris, verhoogde ureum- en creatinewaarden, dyspnoe, hoesten, longoedeem, verhoogde bilirubine, ALAT en ASAT, misselijkheid, braken, diarree, anemie, onrust, angst, verwardheid, slaperigheid, neurologische stoornissen, gewichtstoename, koorts, hoofdpijn, vermoeidheid