

FENTOLAMINE

(REGITINE[®])

Afleveringsvorm

Ampul met 10 mg = 1 ml (10 mg/ml) fentolamine-mesilaat

Toedienen

- Subcutaan: bij extravasatie van sympathicomimetica, 5-10 mg in 10 ml NaCl 0,9%
- Intramusculair: onverdund
- Intraveneus als bolusinjectie: onverdund
- Intraveneus als infuus: toegevoegd aan 50-100 ml glucose 5%, in 10-30 minuten, de toedieningssnelheid is 0,1-2 mg/minuut op geleide van de bloeddruk
- Intracaverneus: in combinatie met papaverine

Code voor toedienen

Categorie A en D

Houdbaarheid

Na verdunnen in infuusvloeistof: 24 uur bij 4 °C of 20 °C.

Infuusvloeistoffen

NaCl 0,9 %, glucose 5%, NaCl/glucose

Verenigbaar met

Y-site: amiodaron
Infuus: dobutamine, noradrenaline, papaverine, verapamil

Onverenigbaar met

IJzerzouten, alkalische oplossingen

Bijzonderheden

- Bevat natriumpyrosulfiet. Deze stof kan allergische reacties veroorzaken.
- Fentolamine moet onder bewaking van hemodynamische parameters worden toegediend.

Acute reacties

Hypotensie

Bijwerkingen

Tachycardie, aritmieën. Zelden: myocardinfarct, cerebrovasculaire spasme en afsluiting, angineuze pijnen.

Na intracaverneuze toediening: priapisme, paresthesie, oppervlakkige hematoma, orgasme- en ejaculatiestoornissen, fibrose