

INFLIXIMAB

(REMICADE®)

Afleveringsvorm

Flacon met 100 mg gelyofiliseerd poeder voor reconstitutie.

Oplosmiddel

Water voor injectie 10 ml

Bereiden

- Los één flacon poeder met 100 mg poeder op in 10 ml water voor injectie dmv naald en spuit. Draai de flacon voorzichtig rond zodat het poeder oplost. NIET schudden ! Schuimvorming is niet ongewoon. Laat de oplossing vijf minuten staan.
- Trek eerst een volume fysiologische oplossing uit een infuuszak 0.9 % NaCl 250 ml gelijk aan het volume van de te dienen dosis Remicadeoplossing .
- Voeg vervolgens langzaam het totale volume van Remicade oplossing toe aan de 250 ml infuuszak en meng voorzichtig.

Toedienen

Intraveneus via infuus over 2 h (max 2 ml/min) m.b.v. een speciale V86 trousse (met ingebouwde proteïnefilter 1.2 µm)

Infuusvloeistoffen

Nacl 0.9%

Houdbaarheid

Aanbeveling om de toediening zo snel mogelijk te starten en zeker binnen 3 uur na bereiding. Indien aseptische bereiding, kan de infusieoplossing binnen de 24 u gebruikt worden op voorwaarde dat het bij 2 °C tot 8 °C bewaard werd.

Acute reacties

Anafylactische shock

Bijzonderheden

- Patiënten die Remicade toegediend krijgen moeten min 1 à 2 h na infusie onder toezicht blijven.
- Niet toedienen samen met andere geneesmiddelen.

Bijwerkingen

Uitgestelde overgevoeligheidsreacties: myalgie, koorts, huiduitslag, keelpijn, hoofdpijn, urticaria.

Infecties

Zeldzaam: lupusachtig syndroom