

# ABCIXIMAG

## REOPRO®

### Afleveringsvorm

Flacon met 10 mg=5 ml(2 mg/ml) abciximab

### Toedienen

- Intraveneus als bolusinjectie: onverdund in 10 minuten
- Intraveneus als continu infuus: toegevoegd aan Nacl 0.9% of glucose 5 %, de toedieningssnelheid is 10 microg/min gedurende 12 uur

### Code voor toedienen

Categorie A en D

### Houdbaarheid

Na verdunnen in infuusvloeistof: direct gebruiken

### Infuusvloeistoffen

Nacl 0.9%, glucose 5%, Nacl/glucose

### Bijzonderheden

- Abciximab mag niet in dezelfde spuit of infuuszak worden gemengd met andere infuusvloeistoffen en geneesmiddelen
- Abciximab dient onder zorgvuldige monitoring van de stollingstijd te worden toegediend. Het verdient aanbeveling telling van trombocyten te verrichten.
- Als gevolg van het productieproces kunnen sporen papaine aanwezig zijn.
- Bevat 0.15 mmol natrium per ml

### Acute reacties

Bloeding (in de eerste 36 uur), allergische reacties. Indien symptomen van een allergische reactie zich openbaren, dient de toediening onmiddellijk te worden gestaakt.

### Bijwerkingen

Hypotensie, misselijkheid, braken, trombocytopenie, hematomen, bradycardie, koorts, vasculaire afwijkingen, rugpijn.