

RIFAMPICINE

(RIFADIN[®])

Afleveringsvorm

Flacon met 600 mg rifampicine poeder voor injectievloeistof

Oplosmiddel

Oplosmiddel (bijgeleverd)

Bereiden

Los 600 mg rifampicine op in 10 ml oplosmiddel. De concentratie is 60 mg/ml.

Toedienen

volwassen:

Intraveneus als infuus: 600 mg toegevoegd aan 500 ml glucose 5%, in 1-3 uur

kind:

Intraveneus als infuus: verdund met glucose 5% tot een concentratie van 1 mg/ml, in 2 uur (maximale concentratie bij vochtbeperking is 6 mg/ml; de dosis dient dan binnen 30 minuten toegediend te worden).

Code voor toedienen

Categorie B

Houdbaarheid

Na verdunnen in infuusvloeistof: 4 uur bij 20 °C

Infuusvloeistoffen

Glucose 5%, indien noodzakelijk NaCl 0,9%

Bijzonderheden

- Rifampicine dient niet gelijktijdig met andere infuusvloeistoffen en geneesmiddelen toegediend te worden.
- Na toediening van rifampicine kan rode verkleuring van urine, zweet, sputum en traanvocht optreden. Dit kan verkleuring van zachte contactlenzen en kleding veroorzaken.

- Bij langdurige toepassing dient de leverfunctie en het bloedbeeld regelmatig gecontroleerd te worden.
- In geval van volumerestrictie kan 600 mg aan 100 ml glucose 5% worden toegevoegd en in 30 minuten worden toegediend.
- Het bijgeleverde oplosmiddel bevat 0,05 mg polysorbaat 80 per ml. In glucose 5% en NaCl 0,9% lost rifampicine niet op.

Acute reacties

Pijnlijkheid op injectieplaats, rash, overgevoelighedsreacties.

Bijwerkingen

Tromboflebitis, maagdarfstoornissen, leverfunctiestoornissen, sufheid, hoofdpijn, duizeligheid, koorts, dyspnoe, spierzwakte, ataxie