

CLONAZEPAM

(RIVOTRIL®)

Afleveringsvorm

Ampul met 1 mg = 1 ml (1 mg/ml) clonazepam

Oplosmiddel

Water voor injecties (bijgeleverde ampulle gebruiken)

Bereiden

Voeg 1 ampul 1 mg = 1 ml clonazepam toe aan 1 ml oplosmiddel. **Het bijgevoegde oplosmiddel pas met de ampulle clonazepam vermengen op moment van de toediening. Voor verder verdunning met glucose 5% of NaCl 0,9% moet een absoluut minimum van 85 ml per opgeloste ampulle gerespecteerd worden.**

Toedienen

Intramusculair: onverdund

Intraveneus als bolusinjectie: onverdund, in 30 seconden

Intraveneus als continue infuus (te geven via een grote vene): **maximaal 3 mg toegevoegd aan tenminste 250 ml glucose 5% of NaCl 0,9%. Meer geconcentreerd is strikt verboden: er ontstaat een onzichtbaar neerslag. Moet men maar 1 ampulle infunderen dan moet men dus een minimum van 85 ml respecteren.**

OPGELET

Voor een infusie moeten glazen recipiënten om de infuusvloeistof in op te hangen gebruikt worden. Er is een adsorptie aan PVC.

Er kan ook voor een spuitpomp geopteerd worden, maar dit impliceert dat er maximaal een halve ampulle per spuitpomp mag opgelost worden (er kunnen wel al twee spuiten klaargemaakt worden om verliezen te voorkomen (houdbaarheid 12 uur).

Code voor toedienen

Categorie A en B

Bekwaamheidsniveau

I.M.: 2

I.V./Infusie: 3

Houdbaarheid

Direct na bereiden en toedienen.

Na verdunnen in infuusvloeistof: 12 uur bij 20 °C.

Infuusvloeistoffen

Glucose 5%, NaCl 0,9%, NaCl/glucose

Bijzonderheden

Bevat alcohol en propyleenglycol: de ampul mag beslist niet onverdund toegediend worden. Clonazepam is slecht oplosbaar in water. Na verdunnen in infuusvloeistof kan een neerslag ontstaan. Troebele oplossingen niet gebruiken.

Bijwerkingen

Sufheid, slaperigheid, spierzwakte, coördinatiestoornissen, anorexie, hoofdpijn, slapeloosheid. Met name bij zuigelingen en kleuters: hypersalivatie en bronchiale hypersecretie. Ten gevolge van te snelle i.v. toediening: ademhalingsdepressi