

NICARDIPINE

(RYDENE[®])

Afleveringsvorm

Ampul met 5 mg = 5 ml (1 mg/ml) nicardipine-hydrochloride

Toedienen

Intraveneus met behulp van spuitpomp

Code voor toedienen

Categorie D

Houdbaarheid

Na verdunnen in infuusvloeistof: 24 uur bij 20 °C

Infuusvloeistoffen

Glucose 5%, NaCl 0,9%, NaCl/glucose

Verenigbaar met

Amikacine, aztreonam, benzylpenicilline, calciumgluconaat, cefazoline, ceftizoxim, chloormafenicol, cimetidine, clindamycine, co-trimoxazol, dobutamine, dopamine, enalapriilaat, erythromycine, esmolol, famotidine, fentanyl, fosfaten, gentamicine, hydrocortison, kaliumchloride, labetalol, lidocaine, magnesiumsulfaat, methylprednisolon, metronidazol, morfine, nitroprusside, piperacilline, ranitidine, theofylline, tobramycine, vancomycine

Onverenigbaar met

Y-site: furosemide, heparine, thiopental (16)
Infuus: ampicilline, natriumbicarbonaat, Ringerlactaat

Bijzonderheden

Bij perifere resp. centrale toediening wordt aangeraden elke 12 resp. 24 uur een andere injectieplaats kiezen.

Acute reacties

Pijnlijkheid en irritatie op injectieplaats

Bijwerkingen

Hoofdpijn, misselijkheid, braken, hypotensie, tachycardie, oedeem. Zelden: ECG-afwijkingen, orthostatische hypotensie, ritmestoornissen, duizeligheid, transpireren, polyurie, paralytische ileus.

Bereiden

Voeg 25 mg = 25 ml toe aan 25 ml NaCl 0,9% of glucose 5%; de eindconcentratie is 0,5 mg/ml

Deze oplossing kan veilig voor een duurtijd van maximaal 12 uur perifeer worden gegeven (vene irritatie), aanbevolen wordt zo snel mogelijk centraal te gaan werken.

Houdbaarheid

Na verdunnen in infuusvloeistof: 24 uur bij 20 °C

Toedienen via perfusor

Gebruikelijke dosering: 3-15 mg/uur

Bijgewerkt en opgeladen, 23/08/2010