

IMMUUNGLOBULINE, HUMAAN

(SANDOGLOBULINE®)

Afleveringsvorm

lyofilisaat 1 g in flacon voor perfusie van 50 ml
lyofilisaat 3 g in flacon voor perfusie van 100 ml
lyofilisaat 6 g in flacon voor perfusie van 200 ml

Oplosmiddel

1 g in 33 ml + transfersysteem voor eenmalig gebruik.

3 g in 100 ml

6 g in 200 ml

Het lyofilisaat kan opgelost worden in fysiologisch(aanwezig in verpakking), in aqua
of in glucose 5 %

Bereiden

De flacon niet schudden(schuimvorming).

Het oplosmiddel zal gekozen worden in functie van de behoeften van de patient aan
vocht, electrolieten of calorieen.

Het is mogelijk dat het lyofylisaat in de oplossing met glucose 5 % langzamer oplost.

Het perfusievolume voor IV kan verminderd worden indien men een hogere
concentratie gebruikt

	1 g	3 g	6 g
3%	33 ml	100 ml	200 ml
6%	16.5 ml	50 ml	100 ml
9%	11 ml	33 ml	66 ml
12%	8.3 ml	25 ml	50 ml

Toedienen

Intraveneus,als infuus.

Alleen heldere vloeistoffen perfunderen, zo mogelijk op lichaamstemperatuur

Code voor toedienen

categorie B

Houdbaarheid

Na oplossen van het lyofilisaat dient de toediening binnen de 6 uur te starten,
indien de oplossing bij kamertemperatuur werd bewaard. Bij bewaring van de

oplossing in de frigo(2-8°C), kan de oplossing tot 24 uur nadien worden gebruikt.

Partieel gebruikte oplossingen raden wij aan, omwille van redenen van microbiologische aard, niet verder op te gebruiken.

Bijzonderheden

Immunoglobuline mag niet tegelijk met andere infuusvloeistoffen en geneesmiddelen worden toegediend

Acute reacties

Allergische reacties. Zelden:anafylactische shock

Bijwerkingen

Rugpijn, hoofdpijn, misselijkheid, braken, gewrichtspijn. Zelden: hypotensie